

SRPEN

na zahradě

- Objeví-li se na listech raných brambor plíseň bramborová, listy po sklizni spalte.
- Na začátku měsíce přihnojte dusíkatým hnojivem cibuli zimní. Dbejte na dostatečnou závlahu.
- Papriky můžete sklízet zelené, jakmile dosáhnou plné velikosti. Využijte je na plnění masovou směsí. Pro konzumaci syrových vyčkejte až zčervenají nebo zežloutnou.
- Pak choi a pekingské zelí dozrají za 42 až 50 dnů. Sklízíte je před 50. dnem od výsevu, aby řapíky nebyly příliš tuhé.
- Na sklizených záhonech vysejte mangold. Ochraňujte ho přes zimu a na jaře brzy vyraší.
- Odřízněte rajčatům vršky hlavních stonů. Další plody by již nestihly dozrát. Také odstraňujte každý postranní výhon.
- Odstraňujte dva až tři spodní listy rajčat. Bude docházet k lepšímu proudění vzduchu a lepšímu vyzrání spodních plodů. Jakmile objevíte napadení chorobami, ihned je odřízněte a spalte.
- Česnek sklízíte po odumření nati. Po vyrytí ho nechte uschnout na vzdušném místě. Pro pěstování v následující sezóně vyberte největší stroužky.
- Cibuli konzumní sklízíte po odumření nadzemní natě a dobrém zatažení. Zelenou nat' nevylamujte a naopak se sklízí ještě vyčkejte.
- Sklízíte listy i květy lichořeřišnice do salátů.
Na začátku měsíce vysejte kerblík. Říká se mu francouzská petržel a je výborný k dochucení pokrmů.
- Do půlky srpna sestříhněte levanduli. Nezasahujte do dřevnaté části, ani u levandule lékařské.
- Sklízíte středomořské bylinky – šalvěj, tymián nebo rozmarýn.
- Do půlky srpna vysadte jahodníky. Příští sezónu se dočkáte velké sklizně. Sazenice, které vysadíte v půlce září, budou mít 30% úrodu, oproti těm, které vysadíte na začátku srpna. Zkombinujte více odrůd jahod, abyste měli delší sklizeň. Při výsadbě nezapomeňte, že srdíčko sazenice musí být těsně nad zemí.
- Od začátku měsíce vysévejte pod stromy zelené hnojení. Ideální je například svazanka nebo hořčice.

ZAHRADNICTVÍ FLOS

- Plody na ovocných stromech, které jsou postižené moniliózou, okamžitě odstraňujte.
- Sestříhejte živý plot z jehličnanů. Stejně jako listnaté živé ploty musí být plot dole širší a nahoře užší, nikoliv kolmý.
- Srpen je vhodný k výsadbě jehličnatých dřevin s kořenovým balem. Při výsadbě nepoškodte kořenový bal. Kůl k ukotvení stromu nezatloukejte ke kmeni, ale šikmo do země, aby nepoškodil kořeny.
- Trvalky od konce měsíce přesazujte a množte dělením. Do zimy stihnou zakořenit.
- Vysadte ocúny. Vykvetou na přelomu září a října. Efektní je vysadit je ve skupině, minimálně po 3.
- Pokud musíte přesadit pivoňky, kořenový bal vysadte mělce, zakryjte ho max. 5 cm zeminy. Pivoňky přesazování nesnáší a kvetou až za několik let.
- Hvozdík bradatý (vousatý) a topolovku vysadte v srpnu, příští rok budete mít silné rostliny.
- Nezapomínejte na závlivu během horkých srpnových dní i u odkvetlých trvalek.
- Snižujte závlivu u hvězdníku nebo amarylisu, od konce měsíce zalévat přestaňte.
- Omezte závlivu u vánočního kaktusu. Květní pupeny se objeví v říjnu. Opět zalévejte rostlinu dle potřeby a nepřemísťujte ji. Stačí jí chladné stanoviště, aby vykvetla.
- Letničky v truhlících přihnojujte 1× týdně vícesložkovým tekutým hnojivem.
- Namnožte si muškáty řízkováním na příští sezónu.
- Řízkujte převislé pokojové rostliny – filodendron, syngonium, raphidophora nebo epipremnum.